لقاح المكورات السحائية:
توصية جديدة بشأن لقاح بلوغ عمر الـ **15** شهرًا

التوصية

يُوصي المجلس الأعلى للصحة (Hoge Gezondheidsraad) باستبدال **اللقاح** المجاني (NeisVac-C®) **المُضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع (C)** الذي يتم إعطاؤه حاليًا في استشارة بلوغ الطفل عمر الـ 15 شهرًا **باللقاح** (Nimenrix®) **المُضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع (ACWY)**. وهذا اللقاح الأخير غير مجاني.

المكورات السحائية "النيسرية السحائية" هي نوع من أنواع البكتيريا. وهناك أنواع مختلفة من بكتيريا المكورات السحائية، ومنها الأنواع A وB وC وW وY التي تشكل خطرًا على البشر. حيث يمكن أن تُسبب التهاب السحايا والتهاب الدماغ وتسمم الدم.

لماذا يُوصي المجلس الأعلى للصحة (Hoge Gezondheidsraad) بلقاح المكورات السحائية ACWY؟

في عام 2018 كانت هناك زيادة في معدل الإصابة بالتهاب المكورات السحائية في بلجيكا (وكذلك في بلدان أوروبية مجاورة) بسبب الأنماط المصلية W وY. لا يزال عدد الإصابات بالتهاب المكورات السحائية مستقرًا في الوقت الحالي. وتظل احتمالية الإصابة بعدوى المكورات السحائية محدودة، ولكن العدوى يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

لماذا لم يتم تضمين اللقاح بعد في الجدول الأساسي المجاني للقاحات؟

في الوقت الحالي، يظل معدل الزيادة في عدد حالات الإصابة محدودًا.
لذلك، لم يتم بعد توفير اللقاح مجانًا في الإقليم الفلمنكي على المدى القصير.

إعطاء اللقاح غير إلزامي

يحق لك الحصول على هذه المعلومات بصفتك أحد الوالدين، وبالتالي فإننا نسألك دون التزام من جانبك عما إذا كنت ترغب في إعطاء هذا اللقاح لطفلك. في هذه الحالة، يمكن لطبيب مركز تقديم المشورة أن يصف هذا اللقاح لإعطائه لطفلك بدلًا من اللقاح المجاني المُضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع (C) عند حضورك لاستشارة بلوغ طفلك عمر الـ 15 شهرًا.

سعر اللقاح

يتوفر لقاح المكورات السحائية ACWY في الصيدليات **وسعره 52.60 يورو.**

يمكنك الحصول عليه من الصيدلية بوصفة من الطبيب "روشتة"، وتأخذه معك إلى استشارة بلوغ طفلك عمر الـ 15 شهرًا. استعلم لدى صندوق تأمين المرض عن إمكانية المساهمة في تغطية سعر شراء هذا اللقاح. اطلب من الصيدلية الحصول على إثبات بشراء القاح.

Kind & Gezin

الجدول العام للقاحات المُوصى بها

لقاح "تطعيم" ضد	8 أسابيع	12 أسبوعًا	16 أسبوعًا	12 شهرًا	15 شهرًا (1)	7-5 سنوات	13-10 سنة (4)	16-14 سنة
شلل الأطفال								
الدفتيريا (الخُنَاق)								
الكزاز (التيتانوس)								
البورديتيلة الشاهوقية (السعال الديكي)								
المستدمية النزلية من النوع (B) (التهاب السحايا)								
التهاب الكبد الوبائي من النوع (B) (اليرقان)								
المكورات العقدية الرئوية (1) الأنماط المصلية 13		(1)						
فيروس الروتا (2)								
الحصبة								
النكاف (إلتهاب الغدة النكفية)								
الحميراء (الحصبة الألمانية)								
المكورات السحائية من النوع C أو ACWY (3) (التهاب السحايا)								
فيروس الورم الحليمي البشري (4)								

مجاني
غير مجاني
لقاح مركب: حقنة واحدة

(1) في حالة ما إذا كان عمر الحمل أقل من 37 أسبوعًا أو كان وزن الطفل عن الولادة أقل من 2.5 كجم:
- تُعطى جرعة إضافية ضد المكورات العقدية الرئوية في عمر 12 أسبوعًا.
- يتم إعطاء لقاحات عمر الـ 15 شهرًا بشكل مبكر في عمر الـ 13 شهرًا.

(2) سعر لقاح فيروس الروتا حوالي 12 يورو بوصفة طبية "روشتة". ويتم تخزينه في الثلاجة (2-8 درجة مئوية).
يلزم تناول جرعتين أو 3 جرعات، حسب نوع العلامة التجارية.

(3) يُوصي المجلس الأعلى للصحة (Hoge Gezondheidsraad) بإعطاء لقاح المكورات السحائية ACWY بدلًا من إعطاء اللقاح المضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع (C) فقط. سعر لقاح ACWY حوالي 53 يورو، ويتم الحصول عليه بوصفة طبية "روشتة". ويتم تخزينه في الثلاجة (2-8 درجة مئوية).

(4) في السنة الأولى من التعليم الثانوي. جرعتان مع فاصل 6 أشهر بينهما.

نقاط خاصة ينبغي التركيز عليها:

تُوصي مؤسسة الطفل والأسرة (Kind en Gezin) بشدة بتطبيق هذا الجدول الأساسي الكامل للقاحات الذي اقترحه المجلس الأعلى للصحة في بلجيكا (Hoge Gezondheidsraad van België).
من الناحية القانونية، فقط إعطاء لقاح شلل الأطفال يكون إلزاميًا.
بالإضافة إلى اللقاحات الواردة في هذا الجدول الأساسي، هناك لقاحات أخرى يمكنك إعطاؤها لتوفير حماية فردية لطفلك، على سبيل المثال اللقاح المُضاد لالتهاب المكورات السحائية من النوع (B)، ولقاح جُدري الماء، ولقاح التهاب الكبد الوبائي من النوع (A).
استشر طبيبك المعالج في هذا الصدد.
لإعطاء اللقاح، لديك حرية الاختيار بين مركز تقديم المشورة التابع لمؤسسة الطفل والأسرة (Kind en Gezin)، أو طبيب الأسرة الخاص بك، أو طبيب الأطفال.

Kind & Gezin