

U kreeg bij ons:

- Norlevo ®
- Ella One ®

*Deze medicatie zorgt er **niet** voor dat u de komende maand beschermd bent tegen zwangerschap.*

Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Ingang 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.seksueelgeweld.be

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

Noodpil of morning after pil

Noodanticonceptie



Noodanticonceptie

Wat

Om een ongewenste zwangerschap te vermijden kreeg u noodanticonceptie (de "morning-after pil") toegediend.

Deze vorm van noodanticonceptie stopt of vertraagt de eisprong.

De morning-afterpil is echter niet werkzaam als de innesteling van de bevruchte eicel al is begonnen. Een noodpil onderbreekt dus een zwangerschap niet, en is dus niet gelijk aan een abortuspil.

Deze medicatie zorgt er niet voor dat u de komende maand beschermd bent tegen zwangerschap.

Behandeling

U was in het ZSG binnen de 3 dagen na de feiten, dan kreeg u Norlevo®.

U was in het ZSG tussen de 3 en 5 dagen na de feiten, dan kreeg u Ella-one®.

Verdere bescherming

Na het innemen van **Norlevo®** moet u een voorbehoedsmiddel gebruiken (condoom) totdat de volgende menstruatieperiode begint. Als u na het gebruik van dit middel nogmaals onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft (ook als dit in dezelfde menstruatiecyclus is), beschermt dit middel niet opnieuw tegen een zwangerschap. Als u gebruik maakt van een gewone anticonceptiemethode zoals de orale anticonceptiepil, dan mag u deze zoals gebruikelijk blijven voortzetten

Na het innemen van **Ella-One®** moet u een voorbehoedsmiddel gebruiken (condoom) totdat de volgende menstruatieperiode begint.

Als u na het gebruik van dit middel nogmaals onbeschermd geslachtsgemeenschap heeft (ook als dit in dezelfde menstruatiecyclus is), beschermt dit middel niet opnieuw tegen een zwangerschap.

Gebruikt u de pil, ring of pleister? Dan moet u 5 dagen wachten met het nemen van uw anticonceptie na de inname van Ella One®. De pil, ring en pleister verhinderen immers de werking van de noodpil.

Als u braakt binnen de 2 uren nadat u Norlevo® hebt genomen of binnen 3 uur nadat u Ella One® hebt genomen, moet u een nieuwe pil innemen of een andere methode kiezen.

Bijwerkingen

De huidige noodpillen geven weinig bijwerkingen. Mogelijks kan u wel last hebben van misselijkheid en kan uw normale menstruatiecyclus verstoord worden. Indien uw maandstonden na 1 maand nog steeds uitblijven, adviseren we om een zwangerschapstest bij de huisarts te laten uitvoeren.

Indien u nog vragen hebt, kan u contact op nemen met het ZSG.

Nuttige links:

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be