

**Roemense vertaling uit het Nederlands van: 'Kernboodschappen koorts'**

## **Febră sau temperatură ridicată?**

Temperatura corpului bebelușului dvs. oscilează între 36,5 °C și 37,5 °C. Temperaturile diferă între bebelușii individuali și va varia pe parcursul zilei. Febra apare atunci când temperatura copilului dvs. crește peste 38 °C.

Febra este reacția normală a corpului la o infecție. Febra nu este periculoasă și nu trebuie tratată întotdeauna. Vârsta copilului dvs. și starea generală de sănătate sunt foarte importante atunci când acesta are febră. Așadar, fiți atent la copilul dvs.!

### **SEMNE DE AVERTIZARE PRIVIND FEBRA**

- Dificultăți de respirație
- Lipsa poftei de mâncare sau de lichide
- Stare de vomă
- Deshidratare; scutece mai uscate, buze uscate și gură uscată și uneori ochi înfundați în orbite
- Fața este palidă și întunecată
- Durere la atingere
- Somnolență, dificultăți la trezirea copilului
- Discurs confuz
- Plâns cu un ton înalt sau grav
- Înțepenirea gâtului
- Mici pete albastre roșiatice (urticarie) pe piele
- Convulsii

Cel mai bine este să consultați medicul dvs. imediat dacă observați unul sau mai multe simptome din cele descrise mai sus chiar și în cazul în care copilul dvs. nu are o temperatură ridicată sau are o mică febră.

### **Febra la un copil mai mic de 3 luni**

- Mergeți la doctor atunci când temperatura este de 38 °C sau mai mare!
- Nu administrați niciun medicament (antipiretic) pentru febră copilului dvs. fără sfatul doctorului.
- Dacă doctorul prescrie orice medicament pentru febră: Administrați doza corectă și în mod corespunzător.
- Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei.
- Administrați copilului dvs. mici cantități de lichide în mod regulat. Dați copilului dvs. mai mult lapte. Dacă alăptați, copilul dvs. poate fi hrănit mai des.

### **Febra la un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 luni**

- Mergeți la doctor atunci când temperatura este de 39 °C sau mai mare!
- Administrați o singură doză de medicament pentru febră dacă există semne de disconfort pronunțat (neliniștit, are dureri sau plânge) sau la sfatul doctorului atunci când așteptați consultația.
- Administrați medicamentul în modul corect și utilizați doza corectă!
- Nu administrați medicamente diferite în combinație sau unele după celelalte.
- Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei.
- În cazul în care copilul dvs. este mai mic de 6 luni, puteți să îi dați mai mult lapte. Dacă alăptați, copilul dvs. poate fi hrănit mai des.

### **Febra la un copil mai mare de 6 luni**

- Administrați o singură doză de medicament pentru febră dacă există semne de disconfort pronunțat (neliniștit, are dureri sau plânge) sau la sfatul doctorului atunci când așteptați consultația.
- Administrați medicamentul în modul corect și utilizați doza corectă!
- Nu administrați medicamente diferite în combinație sau unele după celelalte.
- Monitorizați starea generală a copilului dvs. cu atenție pe durata febrei.
- Dați-le să bea mai mult lapte.