

Vous avez reçu chez nous :

- Norlevo ®
- Ella One ®

*Vous ne serez **pas**
protégée d'une
grossesse pendant le
mois à venir avec ce
médicament.*

Centre de prise en charge des violences sexuelles

Entrée 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.violencessexuelles.be

Hôpital universitaire de Gand
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gand
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

La pilule du lendemain

Contraception d'urgence



Contraception d'urgence

Qu'est-ce que c'est

Vous avez reçu une contraception d'urgence (la « pilule du lendemain ») afin d'éviter une grossesse non désirée.

Ce type de contraception d'urgence interrompt ou retarde l'ovulation. La pilule du lendemain n'a cependant aucun effet si l'implantation de l'ovule fécondé a déjà commencé. Par conséquent, la pilule du lendemain n'interrompt pas une grossesse et doit donc être distinguée de la pilule abortive.

Vous ne serez pas protégée d'une grossesse pendant le mois à venir avec ce médicament.

Traitement

Si vous êtes allée au CPVS dans les 3 jours après les faits, vous avez reçu Norlevo®.

Si vous êtes allée au CPVS entre 3 et 5 jours après les faits, vous avez reçu Ella-one®.

Protection supplémentaire

Après la prise de **Norlevo®** vous devez utiliser un contraceptif (préservatif) jusqu'au début de vos prochaines règles. Ce médicament ne vous protégera pas d'une grossesse si vous avez à nouveau des rapports sexuels non protégés après sa prise (et ce même s'ils ont lieu lors du même cycle menstruel). Si vous utilisez une méthode de contraception régulière telle que la pilule contraceptive, vous pouvez continuer à la prendre normalement.

Après la prise de **Ella-One®** vous devez utiliser un contraceptif (préservatif) jusqu'au début de vos prochaines règles. Ce médicament ne vous protégera pas d'une grossesse si vous avez à nouveau des rapports sexuels non protégés après sa prise (et ce même s'ils ont lieu au cours du même cycle menstruel).

Vous utilisez la pilule, l'anneau ou le patch ? Vous devez alors attendre 5 jours avant de reprendre votre contraception après la prise d'Ella One®. La pilule, l'anneau et le patch empêchent le fonctionnement de la pilule du lendemain.

Si vous vomissez dans les 2 heures suivant la prise de Norlevo® ou dans les 3 heures suivant la prise d'Ella One®, vous devez prendre une autre pilule ou choisir une autre méthode.

Effets secondaires

Les pilules du lendemain n'ont que peu d'effets secondaires. Quelques uns sont à noter cependant, tels que des nausées ou une perturbation du cycle menstruel. Si vous n'avez toujours pas vos règles après 1 mois, nous vous recommandons un test de grossesse auprès de votre médecin généraliste.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec le CPVS.

Liens utiles :

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be