

قرص «صبح روز بعد» (پیشگیری اورژانسی)

پیشگیری اضطراری از بارداری



مرکز مراقبت‌های بعد از
تعرض جنسی

ورودی 47

تلفن + 32 9(0) 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.seksueelgeweld.be

اقلامی که از ما دریافت کردید:

® Norlevo ○

® Ella One ○

این دارو برای ماه آتی
شما را در مقابل
بارداری محافظت
نخواهد کرد.

Universitair ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

تلفن + 32 9(0) 332 11 21 | ایمیل info@uzgent.be

اگر در طی 2 ساعت پس از مصرف
Norlevo® یا در طی 3 ساعت پس از مصرف
Ella One® استفراغ کردید، باید قرص دیگری
مصرف کنید یا روش دیگری را بکار ببرید.

عوارض جانبی

قرص‌های اورژانسی فعلی عوارض جانبی کمی
دارند. ممکن است حالت تهوع تجربه کنید و
سیکل قاعدگی عادی شما مختل شود. اگر بعد از
1 ماه همچنان پریود نشدید، توصیه می‌کنیم یک
آزمایش بارداری توسط پزشکتان انجام شود.

اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً با ZSG
تماس بگیرید.

لینک‌های مفید:

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be

محافظت بیشتر

پس از مصرف Norlevo® باید تا شروع دوره
قاعدگی از یک وسیله ضدبارداری (کاندوم) استفاده
کنید. اگر بعد از مصرف این دارو، رابطه جنسی
محافظت‌نشده داشته باشید (حتی اگر در سیکل قاعدگی
نیز باشد)، این دارو همچنان از شما در برابر بارداری
محافظت نخواهد کرد. اگر از یک روش معمول
پیشگیری از بارداری مانند قرص ضدبارداری خوراکی
استفاده می‌کنید، می‌توانید طبق معمول این کار را ادامه
دهید.

پس از مصرف Ella-One® باید تا شروع دوره
قاعدگی از یک وسیله ضدبارداری (کاندوم) استفاده
کنید.

اگر بعد از مصرف این دارو، رابطه جنسی محافظت‌نشده
داشته باشید (حتی اگر در سیکل قاعدگی نیز باشد)، این
دارو همچنان از شما در برابر بارداری محافظت نخواهد
کرد.

آیا از قرص، رینگ یا چسب ضدبارداری استفاده

می‌کنید؟ در آنصورت باید بعد از مصرف Ella

One®، قبل از مصرف داروهای ضدبارداری 5

روز صبر کنید. قرص، رینگ و چسب

ضدبارداری مانع عملکرد قرص پیشگیری اورژانسی
می‌شوند.

پیشگیری اضطراری از بارداری

چه چیز

برای جلوگیری از بارداری ناخواسته، به شما داروی
پیشگیری اضطراری از بارداری (قرص پیشگیری
اورژانسی یا «صبح روز بعد») داده می‌شود.

این شکل از پیشگیری اضطراری تخم‌گذاری را
متوقف یا کند می‌کند.

بااینحال اگر بارور شدن تخم بارور از قبل شروع شده
باشد، قرص صبح روز بعد اثری نخواهد داشت. قرص
پیشگیری اورژانسی باعث قطع حاملگی نمی‌شود و به
همین دلیل مانند قرص سقط جنین نیست.

این دارو برای ماه آتی شما را در مقابل بارداری
محافظت نخواهد کرد.

درمان

اگر به ZSG

ظرف مدت 3 روز پس از رویداد (تماس جنسی)
مراجعه کردید، Norlevo® به شما داده شد.

اگر بین 3 تا 5 روز پس از این رویداد به ZSG آمدید،
Ella-one® دریافت کردید.