

Size reçete ettiklerimiz:

- Norlevo ®
- Ella One ®

*Bu ilaç, sizi bir sonraki ayın hamilelik riskine karşı **koruyamaz.***

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Cinsel Şiddet Sonrası Tedavi Merkezi

Ingang 47 / Giriş 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.seksueelgeweld.be

Gent Üniversite Hastanesi
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

Acil durum doğum kontrol hapi veya ertesi gün hapi

Acil durum doğum kontrolü



Acil durum doğum kontrolü

Nedir bu acil doğum kontrolü?

İstenmeyen gebelikleri önlemek için size acil durum doğum kontrol hapı (ya da "ertesi gün hapı") verilir.

Bu tür doğum kontrol hapları yumurtlamayı durdurur ya da yavaşlatır. Ancak; döllenmiş yumurtanın rahime yerleşme süreci başladıysa ertesi gün hapı etkili olmayacaktır. Acil durum doğum kontrol hapları, oluşmaya başlamış gebeliği yarıda kesmez ve dolayısıyla düşük ilacı ile aynı şey değildir.

Bu ilaç, sizi bir sonraki ayın hamilelik riskine karşı koruyamaz.

Tedavi

Cinsel şiddete maruz kaldıktan sonra, en fazla 3 gün içinde ZSG'ye gelerseniz size Norlevo® verilir.

Cinsel şiddete maruz kaldıktan sonra, 3 ila 5 gün içinde ZSG'ye gelerseniz o zaman size Ella-One® verilir.

İlave korunma nasıl olur?

Norlevo®'yu aldıktan sonra, bir sonraki âdet döneminiz başlayana kadar, gebelik önleyici (prezervatif) kullanmak zorundasınız. Bu ilacı aldıktan sonra, eğer yeniden korunmasız cinsel ilişkiye girecek olursanız (aynı adet döngüsü içerisinde olsanız dâhi) bu ilaç sizi gebeliğe karşı koruyamaz. Doğum kontrol hapı gibi düzenli bir doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız, yine aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ella-One®'i aldıktan sonra, bir sonraki âdet döneminiz başlayana kadar, gebelik önleyici (prezervatif) kullanmak zorundasınız.

Bu ilacı aldıktan sonra, eğer yeniden korunmasız cinsel ilişkiye girecek olursanız (aynı adet döngüsü içerisinde olsanız dâhi) bu ilaç sizi gebeliğe karşı koruyamaz. Doğum kontrol hapı, vajinal halka ya da gebelik önleyici bant mı kullanıyorsunuz? Öyleyse Ella One® aldıktan sonra, doğum kontrol yönteminizi uygulamadan önce 5 gün beklemek zorundasınız. Çünkü doğum kontrol hapı, vajinal halka ve bantlar, acil durum doğum kontrol hapının işe yaramasına engel olmaktadır.

Norlevo®'yu aldıktan sonra 2 saat, ya da Ella One®'i aldıktan sonra 3 saat içinde kusarsanız bir hap daha alın veya uygulayacak başka bir yöntem seçin.

Yan etkiler

Günümüzde kullanılan acil durum doğum kontrol haplarının bazı yan etkileri vardır. Mide bulantısı hissedebilirsiniz ve normal âdet döngünüz bozulabilir. 1 ay geçtikten sonra hâlâ âdet görmezseniz doktorunuz tarafından yapılacak bir hamilelik testini öneririz.

Hergangi bir sorunuz varsa lütfen ZSG ile irtibata geçin.

Faydalı bağlantılar:

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be