

## U kreeg bij ons:

- Insputing met Egerix B® preventie van hepatitis B
- Azithromycine® (2x 500mg) Preventie en behandeling Chlamydia en Gonorree
- Insputing met Ceftriaxone® Preventie en behandeling Gonorree

○

○

*Gebruik tot aan de definitieve SOA test, **3 maanden** na de feiten, steeds een **condoom** bij seksuele contacten.*

## Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Ingang 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

[zsg@uzgent.be](mailto:zsg@uzgent.be)

[www.seksueelgeweld.be](http://www.seksueelgeweld.be)

Universitair Ziekenhuis Gent  
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent  
T +32 (0)9 332 21 11 | E [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

# Preventieve behandeling

## van Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's)



## Hepatitis B



### Wat

Het Hepatitis B virus kan de lever ernstig aantasten. Een gelige huid, koorts en vermoeidheid zijn hiervan de eerste symptomen. De ziekte is via seksueel contact en/of bloedcontact overdraagbaar, een vaccinatie kan een besmetting voorkomen.

### Behandeling

Als u als kind gevaccineerd werd, kijken wij via een bloedafname of het vaccin u genoeg beschermt tegen besmetting. Indien het vaccin u niet goed genoeg beschermt, geven wij u een herhalingsdosis via een inspuiting in de spier van uw bovenarm met het vaccin Engerix-B®.

Indien u nooit gevaccineerd werd voor hepatitis B zal u op het ZSG de eerste van de 3 inspuitingen Engerix-B® krijgen. Voor de tweede en derde inspuiting verwijzen wij u door naar uw huisarts of wordt u verder gevolgd door onze dienst infectiologie (ARC). Deze vaccinaties moeten worden toegediend na 1 maand en 6 maand.

De meeste mensen hebben weinig last van het vaccin. Mogelijks krijgt u last van wat pijn ter hoogte van de inspuitingsplaats, algemene vermoeidheid of het gevoel ziek te zijn. Deze klachten zijn meestal mild van aard.

## Chlamydia en Gonorroe

Chlamydia en Gonorroe zijn veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in België, vooral bij jongvolwassenen.

### Chlamydia

Meestal merken mensen niet dat ze Chlamydia hebben: de meerderheid heeft geen klachten. Op lange termijn kan Chlamydia tot onvruchtbaarheid leiden bij vrouwen. Het is dus belangrijk om Chlamydia zo snel mogelijk te behandelen. De beste manier om uzelf tegen Chlamydia te beschermen is een condoom gebruiken bij elk seksueel contact (ook bij oraal contact).

### Gonorroe

Gonorroe is een SOA die ook bekend staat als "de druiper". Meestal merken mensen niet dat ze Gonorroe hebben, de meerderheid van reeds besmette mensen hebben geen klachten.

Mannen kunnen bij het plassen felle pijn voelen en geelgroen vocht verliezen uit de penis: de "druiper". Op lange termijn kan Gonorroe tot onvruchtbaarheid leiden bij vrouwen. De beste manier om uzelf tegen Gonorroe te beschermen is een condoom gebruiken bij elk seksueel contact (ook bij oraal contact).

#### Nuttige links:

[www.sensoa.be](http://www.sensoa.be)

[www.allesoverseks.be](http://www.allesoverseks.be)

### Behandeling

Als preventieve behandeling voor Chlamydia en/of Gonorroe, gaven wij u in het ZSG twee soorten antibiotica: 2 pillen (Azithromycine® van 500mg) en een inspuiting (Ceftriaxone®). U kunt mogelijks bijwerkingen ervaren als pijn ter hoogte van de inspuitingsplaats, misselijkheid en/of diarree.

Chlamydia en Gonorroe zijn zeer besmettelijk. Als u een vaste relatie hebt, gaat men ervan uit dat uw partner ook besmet is. Het is dus belangrijk dat ook uw partner meteen behandeld wordt bij de huisarts. Indien dit niet gebeurt, wordt u bij het volgende seksueel contact opnieuw besmet.

### HIV

Indien preventieve medicatie voor HIV opgestart werd, kreeg u van ons hiervan een aparte folder. En wordt u verder gevolgd door de dienst infectiologie van ons ziekenhuis.

### Hertesting

In het ZSG werd een eerste SOA-test uitgevoerd, dit is echter geen definitieve test, en betekent niet dat u SOA vrij bent. Een hertesting via de huisarts (of dienst infectiologie indien u HIV medicatie kreeg). Is ten sterkste aangeraden.

Indien u nog vragen hebt, kan u contact opnemen met het ZSG.