

# العلاج الوقائي

من  
الأمراض  
المنقولة  
جنسياً



مركز رعاية ما بعد التعرض  
للغنف الجنسي (ZSG)

المدخل 47

رقم الهاتف: + 32 9(0) 332 80 80

[zsg@uzgent.be](mailto:zsg@uzgent.be)

[www.seksueelgeweld.be](http://www.seksueelgeweld.be)

لقد حصلت منا على:

○ دواء يُعطى عن طريق  
الحقن وهو Engerix B®  
للوقاية من التهاب الكبد الوبائي من النوع  
(B)

○ أزيثروميسين  
® (4 × 500 مجم  
للوقاية والعلاج من الكلاميديا  
(المتندثرة) والسيلان

○ دواء يُعطى عن طريق  
الحقن وهو سيفترياكسون®  
للوقاية والعلاج من السيلان

○

○

استخدم دائماً الواقي الذكري عند  
الاتصال الجنسي حتى يتم إجراء  
اختبار الكشف عن الأمراض  
المنقولة جنسياً، بعد 3 أشهر من  
الواقعة.

مستشفى غنت الجامعي (UZ Gent)

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

رقم الهاتف +32 9(0) 332 11 21 | البريد  
الإلكتروني  
[info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)



## التهاب الكبد الوبائي من النوع (B)

### ما هو هذا الدواء

يمكن أن يؤثر التهاب الكبد الوبائي من النوع (B) بشكل خطير على الكبد. اصفرار الجلد والحمى والتعب هي الأعراض الأولى لذلك. يمكن أن ينتقل هذا المرض عن طريق الاتصال الجنسي و/أو نقل الدم، ويمكن أن يمنع هذا اللقاح الإصابة بالعدوى.

### العلاج

إذا تم إعطاؤك اللقاح عندما كنت طفلاً، فسوف نبحث عن طريق فحص الدم ما إذا كان اللقاح يحميك بشكل كافٍ من العدوى. إذا كان اللقاح لا يحميك بشكل كافٍ، فسنعطيك جرعة أخرى عن طريق حقن عضلة الجزء العلوي من ذراعك بلقاح Engerix-B®.

إذا لم يتم تطعيمك ضد التهاب الكبد الوبائي من النوع (B) من قبل، فسيتم إعطاؤك أول حقنة من 3 حقن من لقاح Engerix-B® في مركز رعاية ما بعد التعرض للعنف الجنسي (ZSG). وبالنسبة للحقنة الثانية والثالثة، سوف نحيلك إلى طبيب الأسرة أو ستتم متابعتك من قبل قسم الأمراض المعدية (ARC) التابع لنا. يجب إعطاء هذه التطعيمات بعد شهر واحد وبعد ستة أشهر.

معظم الناس لا تظهر عليهم سوى أعراض قليلة من اللقاح. قد تشعر ببعض الألم في موضع الحقن أو تعب عام أو الشعور بالمرض. عادة ما تكون هذه الشكاوى خفيفة، طبيعتها.

## الكلاميديا (المتدثرة) والسيلان

تعتبر الكلاميديا (المتدثرة) والسيلان من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي في بلجيكا، وخاصة عند الشباب.

### الكلاميديا (المتدثرة)

عادة لا يلاحظ الناس أنهم مُصابون بالكلاميديا: الغالبية لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يُعانون من شكاوى. على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي الكلاميديا إلى العقم عند النساء. لذلك من المهم علاج الكلاميديا في أسرع وقت ممكن. أفضل طريقة لحماية نفسك من الكلاميديا هي استخدام الوقاي الذكري عند كل اتصال جنسي (بما في ذلك الاتصال الفموي).

### السيلان

السيلان هو مرض منقول جنسياً، ويعرف أيضاً باسم "التنقيط". عادة لا يلاحظ الناس أنهم مُصابون بمرض السيلان، فغالبية المُصابين لا تظهر عليهم أعراض.

يمكن أن يشعر الرجال بالألم شديد عند التبول ويخرج منهم سائل أصفر مُخضر من القضيب على هيئة: على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي السيلان "تنقيط" أفضل طريقة لحماية نفسك من إلى العقم عند النساء. مرض السيلان هي استخدام الوقاي الذكري عند كل اتصال جنسي (بما في ذلك الاتصال الفموي).

روابط مفيدة:

[www.sensoa.be](http://www.sensoa.be)

[www.allesoverseks.be](http://www.allesoverseks.be)

## العلاج

كعلاج وقائي ضد الكلاميديا و/أو السيلان، أعطيتك نوعين من المضادات الحيوية في مركز رعاية ما بعد التعرض للعنف الجنسي

4 (ZSG): حبات (أزيثرومايسين 500

مجم) ودواء يُعطى عن طريق الحقن وهو (سيفترياكسون®). قد تعاني من بعض الآثار الجانبية مثل الشعور بالألم في موضع الحقن و/أو الغثيان و/أو الإسهال.

الكلاميديا والسيلان مُعديان للغاية. إذا كانت لديك علاقة دائمة، فمن المفترض أن يكون شريك حياتك قد أصيب أيضاً. لذلك من المهم أن يعالج طبيب الأسرة شريك حياتك على الفور. إذا لم يحدث ذلك، فسوف تصاب بالعدوى مرة أخرى في المرة القادمة التي تمارس فيها الجنس مع شريك حياتك.

### فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

عندما تبدأ أخذ العلاج الوقائي ضد فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، فستحصل منا على ملف منفصل حول ذلك. وسيتابعك أيضاً قسم الأمراض المعدية في مستشفىنا.

### إعادة إجراء الاختبار

تم إجراء أول اختبار للكشف عن الأمراض المنقولة جنسياً في مركز رعاية ما بعد التعرض للعنف الجنسي (ZSG)، لكنه اختباراً نهائياً ولا يعني أنك خالٍ من الأمراض المنقولة جنسياً. إعادة إجراء الاختبار عن طريق طبيب الأسرة (أو قسم الأمراض المعدية إذا كنت أخذت دواء فيروس نقص المناعة البشرية HIV). يُوصى به بشدة.

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى الاتصال بمركز رعاية ما بعد التعرض للعنف الجنسي (ZSG).