

Vous avez reçu chez nous :

- Injection d'Engerix B[®] pour la prévention de l'hépatite B
- Azithromycine[®] (4 x 500 mg)
Prévention et traitement chlamydia et gonorrhée
- Injection de Ceftriaxone[®]
Prévention et traitement gonorrhée

○

○

*Utilisez toujours un
préservatif lors de
relations sexuelles
jusqu'au dépistage final
des IST, qui a lieu
3 mois après les faits.*

Centre de prise en charge des violences sexuelles

Entrée 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.violencessexuelles.be

Hôpital universitaire de Gand
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gand
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

Traitement préventif

des Infections sexuellement transmissibles (IST)



Hépatite B

Qu'est-ce que c'est

Le virus de l'hépatite B peut affecter gravement le foie. Peau jaune, fièvre et fatigue en sont les premiers symptômes. La maladie se transmet par contact sexuel et/ou sanguin, la vaccination peut prévenir une infection.



Traitement

Si vous avez été vacciné(e) dans votre enfance, une prise de sang nous permettra de déterminer si le vaccin vous protège de l'infection. S'il s'avère que le vaccin ne vous protège pas suffisamment, nous vous administrerons un rappel du vaccin Engerix-B® dans le muscle de votre bras.

Si vous n'avez jamais été vacciné contre l'hépatite B, la première des 3 injections d'Engerix-B® vous sera administrée au CPVS. Pour la deuxième et la troisième injection, nous vous redirigerons vers votre médecin traitant ou vous serez suivi(e) par notre service d'infectiologie (ARC). Ces vaccins doivent avoir lieu après 1 mois et 6 mois.

La plupart des personnes vaccinées ne ressentent que peu d'effets secondaires. Une douleur à l'endroit de l'injection, une fatigue générale ou des nausées peuvent être ressenties. Ces désagréments sont généralement mineurs.

Chlamydia et gonorrhée

La chlamydia et la gonorrhée sont des infections sexuellement transmissibles (IST) courantes en Belgique, surtout chez les jeunes adultes.

Chlamydia

La chlamydia passe généralement inaperçue : la plupart des patients ne présentent aucun symptômes. Mais à long terme, la chlamydia peut conduire à l'infertilité chez les femmes. Il est donc important de traiter la chlamydia le plus tôt possible. La meilleure manière de se protéger de la chlamydia est d' utiliser un préservatif lors de chaque rapport sexuel (même oral).

Gonorrhée

La gonorrhée est une IST aussi connue sous le nom de « chaude-pisse ». La plupart des personnes atteintes de gonorrhée ne s'en aperçoivent pas, car elle est souvent asymptomatique.

Les hommes peuvent ressentir une douleur intense en urinant, et un pus jaunâtre peut s'écouler du pénis : la « chaude-pisse ». À long terme, la gonorrhée peut conduire à l'infertilité chez les femmes. La meilleure manière de se protéger de la gonorrhée est d' utiliser un préservatif lors de chaque rapport sexuel (même oral).

Liens utiles :

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be

Traitement

Nous vous avons fourni deux types d'antibiotiques au CPVS en guise de traitement préventif contre la chlamydia et/ou la gonorrhée : 4 comprimés (Azithromycine® de 500 mg) et une injection (Ceftriaxone®). Vous ressentirez peut-être quelques effets secondaires tels que des douleurs à l'endroit de l'injection, des nausées ou des diarrhées.

La chlamydia et la gonorrhée sont extrêmement contagieuses. Si vous êtes en couple, nous partons du principe que votre partenaire aussi est contaminé . Votre partenaire doit donc impérativement se faire traiter auprès de votre généraliste le plus tôt possible. Dans le cas contraire, vous serez à nouveau contaminé(e) lors de votre prochain rapport sexuel.

VIH

Si vous avez entamé un traitement préventif contre le VIH, nous avons établi pour vous un dossier à part. Vous serez alors suivi(e) par le service d'infectiologie de notre hôpital.

Deuxième dépistage

Un premier dépistage IST a été effectué au CPVS, mais ce test n'est pas définitif et ne signifie pas que vous n'êtes pas infecté(e). Un second dépistage chez votre médecin traitant (ou au service d'infectiologie si vous suivez un traitement VIH) est fortement recommandé.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec le CPVS.