

# درمان پیشگیرانه بیماری‌های مسری جنسی (STD)



## مرکز مراقبت‌های بعد از تعرض جنسی

ورودی 47

تلفن + 32 9(0) 332 80 80

[zsg@uzgent.be](mailto:zsg@uzgent.be)

[www.seksueelgeweld.be](http://www.seksueelgeweld.be)

اقلامی که از ما دریافت کردید:

○ تزریق با  
Engerix B® برای  
پیشگیری از هپاتیت ب

○ Azithromycine®  
(4 عدد 500 میلی‌گرم)  
پیشگیری و درمان  
کلامیدیا و سوزاک

○ تزریق با  
Ceftriaxone®  
پیشگیری و درمان  
سوزاک

○

○

تا زمان تست قطعی  
۳، STD ماه بعد از  
رویداد، همواره هنگام  
تماس‌های جنسی از کاندوم  
استفاده کنید.

Universitair ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

تلفن +32 9(0) 332 11 21 | ایمیل [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

## هپاتیت ب

### چه چیز



ویروس هپاتیت ب می‌تواند آسیب جدی به کبد وارد کند. زردی پوست، تب و خستگی نخستین نشانه‌های این است. این بیماری می‌تواند از طریق تماس جنسی و یا تماس خونی منتقل شود. واکسیناسیون می‌تواند از عفونت جلوگیری کند.

### درمان

اگر در کودکی واکسینه شده باشید، با استفاده از آزمایش خون بررسی خواهیم کرد واکسن به میزان کافی از شما در برابر عفونت محافظت می‌کند یا نه. اگر واکسن به اندازه کافی از شما محافظت نمی‌کند، با تزریق واکسن **Engerix-B®** در ماهیچه بازوی فوقانی شما، مقداری دوز تقویتی به شما خواهیم داد.

اگر هیچگاه برای هپاتیت ب واکسینه نشده‌اید، اولین تزریق از ۳ نوبت واکسن هپاتیت ب را در **ZSG** دریافت خواهید کرد. برای تزریق دوم و سوم، شما را به پزشکتان ارجاع می‌دهیم یا بخش بیماری‌های عفونی ما (**ARC**) پیگیر تزریق شما خواهد شد. این واکسن‌ها باید پس از 1 ماه و 6 ماه تجویز شوند.

اکثر مردم مشکلی با واکسیناسیون ندارند. ممکن است درد اندکی در محل تزریق، خستگی عمومی یا احساس مریضی تجربه کنید. این مشکلات معمولاً خفیف هستند.

## کلامیدیا و سوزاک

کلامیدیا و سوزاک بیماری‌های جنسی شایع (**STDها**) در بلژیک، به خصوص در بین جوانان هستند.

### کلامیدیا

معمولاً مردم متوجه ابتلای خود به کلامیدیا نمی‌شوند؛ اکثریت مبتلایان هیچ شکایتی ندارند. در بلندمدت، کلامیدیا می‌تواند منجر به بروز نازایی در زنان شود. پس مهم است هر چه زودتر برای درمان کلامیدیا اقدام کنید. بهترین راه برای محافظت از خودتان در برابر کلامیدیا، استفاده از کاندوم در هر تماس جنسی (از جمله تماس دهانی) است.

### سوزاک

سوزاک یک **STD** است که در هلندی «**druiper**» نیز نامیده می‌شود. معمولاً افراد متوجه نمی‌شوند به سوزاک مبتلا شده‌اند، اکثر افراد آلوده، هیچ شکایتی جسمی ندارند.

علامت سوزاک: مردان ممکن است هنگام ادرار درد شدیدی احساس کنند و مایع زرد مایل به سبزی از آلت در بلندمدت، سوزاک می‌تواند تناسلی‌شان خارج شود. بهترین راه برای منجر به بروز نازایی در زنان شود. محافظت از خودتان در برابر سوزاک، استفاده از کاندوم در هر تماس جنسی (از جمله تماس دهانی) است.

لینک‌های مفید:

[www.sensoa.be](http://www.sensoa.be)

[www.allesoverseks.be](http://www.allesoverseks.be)

## درمان

به عنوان درمان پیشگیرانه کلامیدیا و/یا سوزاک، دو نوع آنتی‌بیوتیک به شما داده‌ایم: ۴ عدد قرص (آزیترومایسین ۵۰۰ میلی‌گرم) و تزریق (**Ceftriaxone®**). ممکن است عوارض جانبی نظیر درد در محل تزریق، تهوع و یا اسهال را تجربه کنید.

کلامیدیا و سوزاک شدیداً مسری هستند. اگر در یک رابطه ثابت هستید، فرض بر این خواهد بود که **پارتنر شما هم آلوده** شده‌است. بنابراین مهم است شریک شما بلافاصله توسط پزشک درمان شود. اگر این کار انجام نشود، نوبت بعدی که تماس جنسی دارید، دوباره آلوده خواهید شد.

## VIH

اگر درمان پیشگیرانه **HIV** شروع شده باشد، یک پوشه جداگانه از ما دریافت خواهید کرد. و بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان پیگیر امور شما خواهد بود.

## آزمایش مجدد

اولین تست **STD** در **ZSG** انجام شد، اما این تست قطعی نیست و به این معنی نیست که شما مبتلا به **STD** نیستید. یک آزمایش مجدد توسط پزشک عمومی (یا بخش عفونی، اگر داروی **HIV** دریافت کرده‌اید) اکیداً توصیه می‌شود.

اگر سؤال دیگری دارید، لطفاً با **ZSG** تماس بگیرید.