

Size reçete ettiklerimiz:

- Hepatit B'yi önlemek için Engerix B® iğne
- Azithromycine ® (4x 500 mg)
Klamidya ve Belsoğukluğunu önlemek ve tedavi etmek için
- Ceftriaxone ® İğne
Belsoğukluğunu önlemek ve tedavi etmek için

○

○

*Yaşadığınız cinsel saldırıdan sonraki **3 ay** boyunca ve son CYBH (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar) testinin sonucu temiz çıkana*

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Cinsel Şiddet Sonrası Tedavi Merkezi

Ingang 47 / Giriş 47

T+ 32 (0)9 332 80 80

zsg@uzgent.be

www.seksueelgeweld.be

Gent Üniversite Hastanesi

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

Koruyucu tedavi

cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) için



Hepatit B

Nedir bu Hepatit B?

Hepatit B virüsü, karaciğeri ciddi şekilde etkiler. İlk belirtileri; sarıya çalan ten rengi, ateş ve bitkinlik hissidir. Bu hastalık, cinsel yolla ve/veya kan yoluyla bulaşmaktadır ve aşı yaptırmak bu hastalığa yakalanmanızı önleyebilir.

Tedavi

Eğer çocukken Hepatit B aşısı yaptırdıysanız aşının sizi bu hastalığa karşı hâlâ koruyup korumadığını öğrenmek için sizden kan alınır. Aşının sizi artık korumadığı anlaşılırsa kolunuzun omuza yakın bir yerine, takviye bir doz (Engerix-B®) enjekte edilir.

Eğer hiç Hepatit B aşısı olmadıysanız 3 Engerix-B® iğnenizin ilkinizi ZSG'de olursunuz. İkinci ve üçüncü iğneler için de ya sizi bir doktora yönlendiririz, ya da hastanemizin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde (ARC) tedavinize devam edersiniz. Bu aşılar ilk aşıdan sonraki 1. ay ve 6. ayda yapılmalıdır.

Bu aşının yan etkileri çoğu insanda ya çok az görülür ya da hiç görülmez. Aşının vurulduğu yerde hafif bir ağrı, genel bir yorgunluk ya da biraz hastaymışsınız gibi hissedebilirsiniz. Bahsedilen bu şikâyetler genellikle hafif seyredir.



Klamidya ve Belsoğukluğu

Klamidya ve Belsoğukluğu, Belçika'da özellikle genç yetişkinler arasında sıkça görülen, cinsel yolla bulaşan hastalıklardır (CYBH).

Klamidya

Birçok insan, belirti göstermedikleri için, Klamidya geçirdiklerini fark etmez. Klamidya, uzun dönemde kadınlarda kısırlığa sebep olabilir. Bu yüzden; Klamidyayı mümkün olan en kısa zamanda tedavi etmek önemlidir. Kendinizi Klamidyaya karşı korumanın en iyi yolu; her cinsel ilişkiye girdiğinizde (buna oral seks de dâhil) prezervatif kullanmaktır.

Belsoğukluğu

Belsoğukluğu, frengi adıyla da bilinen bir CYBH'dir (Cinsel yolla bulaşan hastalık). Birçok insan, belirti göstermedikleri için, Belsoğukluğu geçirdiklerini fark etmez.

Erkekler, çişlerini yaparken şiddetli ağrı hissedebilirler ve sarı-yeşil bir sıvı penislerinden sızıntı şeklinde akabilir. Belsoğukluğu, uzun dönemde kadınlarda kısırlığa sebep olabilir. Kendinizi Belsoğukluğuna karşı korumanın en iyi yolu; her cinsel ilişkiye girdiğinizde (buna oral seks de dâhil) prezervatif kullanmaktır.

Faydalı bağlantılar:

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be

Tedavi

Hem Klamidya hem Belsoğukluğu için koruyucu tedavi olarak; ZSG'de size iki tip antibiyotik veririz: 4 adet hap (500 mg'lık Azithromycine®) ve bir iğne (Ceftriaxone®). İğnenin yapıldığı yerde ağrı, bulantı ve/veya ishal gibi yan etkiler görülebilir.

Klamidya ve Belsoğukluğu son derece bulaşıcıdır. Eğer ciddi bir ilişkiniz varsa bu hastalığın partnerinize de bulaştığı düşünülür. Bu yüzden; partnerinizin de vakit kaybetmeden tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi edilmezse, bir sonraki cinsel ilişkinizde hastalık size yeniden bulaşır.

HIV

HIV için koruyucu tedavi başlanmıyorsa, size başka bir broşür daha veririz. Ayrıca; hastanemizin enfeksiyon hastalıkları bölümü de tedavinizi takip eder.

Yeniden test yapılması

ZSG'de size bir test uygularız, ancak bu kesin belirleyici bir test olmaz ve CYBH'dan (cinsel yolla bulaşan hastalıklar) tamamen kurtulduğunuz anlamına gelmez. Doktorunuz tarafından (ya da eğer HIV için ilaç başlanmıyorsa enfeksiyon hastalıkları bölümü tarafından) yeniden bir test yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen ZSG ile irtibata geçin.